Batarde longue

Vass8R02s156-160

With A Collection Vassal-Montpellier

Residence longue

Residence lo

Date: 9.7 2014
Personne: LP
Nb feuille:

Mècle
Batarde longue

Vass8R02s156-160





dantadantadantadantad



Batarde longue DESIGNATION CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A Souche 8 Vigueur: 3 PORT : érig - ¿ érig - couché Pédoncule : L - M - (C) Millerandage: 3 Date de Véraison : 2, 8, 72 , 5.

Date de Maturité : 18,9,16 muluie Pourriture: 0 GRAPPE : G - M - P 10 L - M - C BAIE : TG - G - M - P 14 x14 disc. - sph - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s11 avec pépins - apyrène s30 JUS : inc - coloré

DESIGNATION: Batarde longue

CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A Souche?

Vigueur: 6,5

PORT: érig - 1/2 érig - couché

Pédoncule: L - M - C

Millerandage: 0 2-8-74 + 2

Date de Véraison: 2-8-74 + 2

Date de Maturation: 28 8 74

Pourriture: 0 10

GRAPPE: G - N - P: L - N - C

BAIE: TG - G - R - P 16 x 15

disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl - fus.

CGULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$12

\$24

\$30

avec pépins - apyrène

\$41

\$53

JUS: Inc. - coloré

Inntroduction by the Inntroduction

dantadantadantadantad

!	! Nombre total	Dates								
1		3-4	!	!	!	1	1	1		
1 1	19	2	1		- 1	1	1	!		
1 2	!	!	!	!	1	1	1	!		
1 3	!	!	!	!	!	1	1	!		
1 4	!	!	1	!	!	1	1	1		
! 5	!	! !	1	!		!	1	!		
				10 6 3	-4-68	+ 10				

Désignation : Emplacement : Satarde largue 4.24 A 8 & 1

dantan kadaa lindaa kadaal

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno

41 - épanoui O - moyon 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 6

42 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé gluscuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 6

44 - blanches O, fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo Mai 65 Désignation: Batarde langue Emplacement: 4.24 A 8 s. 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéoux Oduveteux O- cotonneux 9.

à limbe plan o en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 light

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaunc 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux O-duveteux 8 cotonnoux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🕖

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux duve teux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement

(I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 8 - morphologiquement: mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

> Calvo Mai 65

Batarde longue

Désignation :

Emplacement: 4.24 A8 A. 1

Juntanianti <mark>minatiniantini</mark>

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithallo : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

dantadantadantadantad

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

i dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 51 - nocuds

: verte 1 - jaune 2 - rouge clair Blabel rouge foncé 4. 52 - vrille

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Emplacement: 4.24 A8 p.1 Désignation: Batarde longue

Lundandandan

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 6

Coppella

dantadari mbahalari mbahalari mb

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 6.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
 - A ombilic persistant / non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7.)
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte () rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 6 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré (9)
- 33 De séparation facile (égreneuse) () difficile 2.

Calvo 72

Batarde longue

dantadantadantadantad

```
DENOMINATION:
EMPLACEMENT: 4 24 A 8 4.1
```

```
SARMENT DE VIGNE
                             : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
Sarment
                              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en m lames (2)
Ecorce
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3),
                               autre (4).
                             unic (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3).
Surface
                              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
                              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Nocuds
Mérithalle de longueur moyenne : ......................... cms.
                              : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4).
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                              : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).
                              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                                violacé (7), autre (8).
                              : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (()) large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Calvo 70

Nº d'ordre: Désignation : Batarde longue
Origine: = Mede
Emplacement: Vas Vign 4-24 A8
8 - Angle des nervures
Médiane/Base : 6-0-8.

uluntuuluntuuluntuuluntuul

Formulaire de description 1/8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

188

Année:2010

Observateur:

Code cépage: 188Mtp4

NomVar : Mècle de Bourgoin

Nom introduction: Batarde longue

Emplacement: Vass8R02s156-160

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 303 époque de véraison : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 304 maturité physiologique de la baie : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.

oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.

oiv 306 coloration des feuilles en automne : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)**: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)**: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 résistance Botrytis grappe : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal:

	Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
g. A	1 dulte Konja	Rosée				
	2	8	26 3	29/3		
(la m	3 pritie de la sou	che on tota de Sole)	30/3		
hong	éc 4	H		26 3		
	5	2	1 ba coul 26/3 gua	Ann 29/3		
	Moyenne		20 1	28/3		

-1

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
				2/08.	2/3	

+2

+1

Formulaire de description 5 / 8 Observation à maturité physiologique

dinationlendinationlendinational

Observateur:

Année : 2010 Programme : GrapGene06 Code introduction: 188Mtp4

Nom introduction: Batarde longue Emplacement: Vass8R02s156-160

GRAPPE

GRAPPE										
Code	Descripteur	1	3	5	7	9				
Oiv 202	Longueur Valeur absolue (en cm): 17	Très courte (<10 cm)	Courte (10-14 cm)	Møyenne (14-18 cm)	Longue (18-25 cm)	Très longue (>25 cm)				
Oiv 203	Largeur Valeur absolue (en cm): 12	Très étroite (<5 cm)	Etroite (5-10 cm)	Moyenne (10-15 cm)	Large (15-20 cm)	Très large (>20 cm)				
Oiv 204	Compacité	Très lâche	Lâche	Møyenne	Compacte	Très compacte				
Vassal	Millerandage	Nul ou t. fb.	Faible	Møyen	Fort	Très fort				
Oiv 206	Longueur du pédoncule	Très court (<3 cm)	Court (3-5 cm)	Moyen (5-7 cm)	Long (7-10 cm)	Très long (>10 cm)				
Oiv 207	Lignification du pédoncule	Base seulement		Moitié	Plus de la moitié					
Vassal	Couleur de l'axe de la rafle	1-Coloré	2-Non color							
Oiv 208	Forme de la grappe	1-Cylindrique	2-Conique ou pyramidale	3-En entonnoir						
Oiv 209	Présence d'un aileron	1-Absent	2- Une à trois ailes	3- Plus de trois ailes						

DAIL										
Oiv 220	Longueur Valeur absolue (en cm): 17			Très courte (<8mm)	Court (8-14m			oyenne 20mm)	Longue (20-26mm)	Très longue (>26mm)
Oiv 221	Valeur absolue (en em): 17 m			Très étroite (<8mm)	Etroit (8-14m		Movenne (14-20mm)		Large (20-26mm)	Très large (>26mm)
Oiv 222	Uniformité de la grosseur			1-Non uniforme	3-Unifo	rme				
Oiv 223	Forme 1- (2-) Aplatic Arrendic		3- Elliptique	4- Ovoïde	5- Tr ovo			7- Cylindrique	8- Arquée	
Oiv 225	Couleur épiderme 1- Vert jaune			2- Rose	3- Roug	ge ge		4- Gris	5- Rouge-Violet	Bleu-Noir
Oiv 226	Uniformité couleur épiderme			1- Non uniforme	Unifor	me				
Oiv 227	Pruine			Nul ou t. fb.	Faibl	e	Mo	yenne	Forte	Très forte
Oiv 228	Epaisseur pellicule			Très mince	Minc	e e	Moyenne		Epaisse	Très épaisse
Oiv 229	Ombilic (apparence)			1- Peu apparent	2- Appare	ent				
Oiv 229	Ombilic (dépression)			1- Déprimée	2- No déprin	/				
Oiv 230	Coloration de la pulpe			1-Non colorée	2- Colore	ée				
Oiv 231	Intensité de la co	oloration de	e la pulpe	Non colorée	Faibl colorat			oyenne oration	Forte coloration	Très forte coloration
Oiv 232	Succulence de la	Succulence de la pulpe			Juteus	se				
Oiv 233	Rendement en ju	Rendement en jus (ml / 100g baies)			Faibl	e	M	loyen	Elevé	
Oiv 235	Fermeté de la pulpe			Très faible	Faibl	9	Mo	yenne	Elevée	Très élevée
Oiv 236	Saveur	Saveur			2- Musc	atée	3-	Foxée	4- Herbacée	5-Autre
Oiv 238	Longueur pédicelle			Très court (<4mm)	Cour (4-8mi	7		oyen 12mm)	Long (12-16mm)	Très long (>16mm)
Oiv 240	Séparation du pé	edicelle		Très facile	Facil	9	M	oyen	Difficile	Très difficile
			1	Depres						

PEPINS

Oiv 241	Présence de pépins		osents rinthien)	2- Rudir (type su	3-Présents	
Oiv 242	Longueur pépins Valeur absolue (en mm):	Très courts	Courts	Moyens	Longs	Très longs
Oiv 243	Poids d'un pépin (moy. de 100 pépins secs) Valeur absolue (en cm):	Très faible (<10mg)	Faible (25mg))	Moyen (40mg)	Elevé (55mg)	Très élevé (>65mg)
Oiv 244	Cannelures transversales face dorsale pépins	1-Absentes	2-Présentes			

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année: 2010 22/12/2016

Observateur: (M

dantadantadantadantad

Programme: GrapGene06

Code introduction: 188Mtp4

Nom introduction: Batarde longue

Emplacement: Vass8R02s156-160

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1- elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3)

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles: absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence 12 présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 1- présence 9.

oiv 351 vigueur *: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons: très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7) très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue: 40 mm

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 -

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Valeur absolue : 2 mm

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1 – partiellement présente 2 – présente 3.

^{*} voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »